

Vævsprøve ved blødningsforstyrrelser

En gynækologisk endometriebiopsi eller en pipelle prøve, er en vævsprøve fra livmoderens slimhinde. Det foregår i lokal bedøvelse.

Det sker, at menstruationen skifter karakter, styrke og varighed, især når man er over 40 år. Det kan også være, at man pletbløder mellem menstruationen eller har pletblødninger ved samleje. Dette skyldes oftest hormonforstyrrelser eller en godartet lidelse som fx en polyp på livmoderhalsen eller inde i livmoderen.

Det er derimod meget sjældent, at en kvinde, der endnu ikke er gået i overgangsalderen har blødningsforstyrrelser fordi hun fejler noget ondartet.

Ældre kvinder, som begynder at bløde igen efter [overgangsalderen](#), også kaldet postmenopausal blødning, bør som regel have foretaget en vævsprøve.

Lægen foretager først en [gynækologisk undersøgelse](#) og en ultralyds skanning. Forud for dette kan gives smertestillende medicin eller lokal bedøvelse. Herefter indføres et tyndt plasticrør i livmoderhulen og slimhinden løsnes fra indersiden af livmoderhalsen eller livmoderhulen og suges ud. Prøven sendes til mikroskopisk undersøgelse hos en patolog. Du får svar på prøven efter ca 2 uger.

Efter en vævsprøven kan der være menstruationslignende smerter og blødning i nogen få dage .Det er normalt, at man pletbløder i dagene efter en vævsprøve. Du kan eventuelt tage 1 g Pamol og/eller 400 mg Ipren. Hvis der er vedblivende smerter, feber eller du begynder at bløde meget, skal gynækologen, egen læge eller vagtlægen kontaktes.

Trine Kølby
Speciallæge

25.09.2016

Revideres september 2019